Cours de mathématiques P.S.I.*

D'après les cours de M. Guillaumie

Henriet Quentin

Espaces vectoriels normés

Dans ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$ -ev.

I. Norme

I.I. Définition et premières propriétés

Définition :

On appelle norme de E (ou sur E) toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

Remarque :

Si N est homogène, en prenant $\lambda=0$,
 $N(0 \cdot x) = |0| N(x) = 0$,
 donc $N(0_E) = 0$: la réciproque de
 l'axiome de séparation est déjà
 acquise.

1. $\forall x \in E, N(x) \geq 0$ (positivité)
2. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda \cdot x) = |\lambda| N(x)$ (homogénéité)
3. $\forall x, y \in E, N(x+y) \leq N(x) + N(y)$ (inégalité triangulaire)
4. $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$ (axiome de séparation)

Une norme est généralement notée $N, \| \cdot \|, \| \cdot \|_p, p \in \mathbb{R}_+^*, \| \cdot \|_\infty$.

Définition :

Le couple (E, N) est appelé espace vectoriel normé.

Proposition :

Soit $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $N(0_E) = 0$ et $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda x) \leq |\lambda| \cdot N(x)$. Alors N est homogène.

Preuve :

1^{er} cas : $\lambda=0$: $N(0 \cdot x) = N(0_E) = 0 = 0 \cdot N(x)$

2^{ème} cas : $\lambda \neq 0$: on pose $y = \lambda \cdot x \Leftrightarrow x = \frac{1}{\lambda} y$, alors $N\left(\frac{1}{\lambda} y\right) \leq \left|\frac{1}{\lambda}\right| \cdot y \Leftrightarrow N(x) \leq \frac{1}{|\lambda|} N(\lambda \cdot x) \Leftrightarrow N(\lambda \cdot x) \geq |\lambda| \cdot N(x)$.

Note :

Dans la suite du chapitre, on note $\| \cdot \|$ une norme de E .

Définition :

On dit qu'un vecteur $x \in E$ est unitaire ou normé pour $\| \cdot \|$ si $\|x\| = 1$.

Proposition :

Soit $x \in E \setminus \{0_E\}$. $\frac{x}{\|x\|}$ est normé.

Proposition : 2^{ème} inégalité triangulaire :

Soit $(x, y) \in E^2$. $\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\|$.

Preuve :

$\|x\| = \|(x-y) + y\| \leq \|x-y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$.

De même, $\|y\| - \|x\| \leq \|y-x\| = \|x-y\|$.

Définition :

On appelle distance associée à la norme $\| \cdot \|$ l'application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = \|x - y\|$.

Proposition :

La distance d associée à $\| \cdot \|$ vérifie :

Remarque :

Soit E un espace non vide. Toute application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés de la proposition est appelée distance sur E .

1. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) \geq 0$.
2. $\forall (x, y) \in E^2, d(y, x) = d(x, y)$
3. $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
4. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

Définition :

Soit $a \in E$ (E normé) et $A \subset E, A \neq \emptyset$. On appelle distance de a à A le réel noté $d(a, A)$ vérifiant
 $d(a, A) = \inf \{ \|a - x\|, x \in A \}$.

1.2. Exemples fondamentaux

1.2.1. Norme euclidienne

Théorème :

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire noté $\langle \cdot | \cdot \rangle$ (espace préhilbertien réel). L'application $\| \cdot \|_2 : x \in E \mapsto \sqrt{\langle x | x \rangle}$ est une norme sur E , dite norme euclidienne.

Remarques :

- L'inégalité triangulaire est le point délicat, elle provient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
- Quand on pense être en présence d'une norme euclidienne, on détermine ce qui doit être le produit scalaire associé et on montre que c'est bien un produit scalaire sur E .

1.2.2. $E = \mathbb{K}^n$

Définition :

Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. On note $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$, et $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Proposition :

$\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sont trois normes de $\mathbb{K}^n$, dites normes usuelles de $\mathbb{K}^n$.

Preuve :

$\| \cdot \|_1$: – Positivité évidente.

– Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \Rightarrow \|\lambda x\|_1 = \sum_{i=1}^n |\lambda x_i| = |\lambda| \|x\|_1 \Rightarrow$ Homogénéité.

– Soient $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$

$\|x + y\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1 \Rightarrow$ Inégalité triangulaire.

– Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|x\|_1 = 0$, c'est-à-dire $\sum_{i=1}^n |x_i| = 0$, donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|x_i| = 0$

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i = 0$, donc $x = 0_{\mathbb{K}^n} \Rightarrow$ Axiome de séparation.

$\| \cdot \|_2$: Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Il s'agit de la norme issue du produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$: Si $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, $\langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. Ainsi $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x | x \rangle}$, et on sait que $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

$\| \cdot \|_\infty$: Si $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_\infty = \max |x_i|$ vérifie : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|x_i| \leq \|x\|_\infty$, et $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$.

– $|x_i| = \|x\|_\infty$, et $|x_i| \geq 0 \Rightarrow$ Positivité.

– Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$, et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|\lambda x_i| = |\lambda| |x_i| \leq |\lambda| \|x\|_\infty = |\lambda| |x_{i_0}| = |\lambda x_{i_0}|$
Ainsi $|\lambda x_{i_0}|$ majore $\{| \lambda x_i |, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$, et y appartient, donc $|\lambda| |x_{i_0}| = \max \{ |\lambda x_i|, i \in \llbracket 1, n \rrbracket \}$.

Ainsi $\|\lambda x\|_\infty = |\lambda| \|x\|_\infty \Rightarrow$ Homogénéité.

– Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$. $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$, donc $\|x + y\|_\infty$ majore $\{|x_i + y_i|, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$

Donc $\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \Rightarrow$ Inégalité triangulaire.

– Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|x\|_\infty = 0$. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $0 \leq |x_i| \leq \|x\|_\infty = 0$, donc $|x_i| = 0$, donc $x_i = 0$.

Ainsi $x = 0_E \Rightarrow$ Axiome de séparation.

Proposition : généralisation du cas précédent :

On suppose que E est un espace de dimension n finie, $n \geq 1$. Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base de E .

Pour $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i \in E$, on note $\|\vec{x}\|_{1, \mathcal{B}} = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|\vec{x}\|_{2, \mathcal{B}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$, et $\|\vec{x}\|_{\infty, \mathcal{B}} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

$\| \cdot \|_{1, \mathcal{B}}$, $\| \cdot \|_{2, \mathcal{B}}$ et $\| \cdot \|_{\infty, \mathcal{B}}$ sont des normes de E , associées à la base $\mathcal{B}$.

1.2.3. $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$

Définition :

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$, on pose $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$, $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$, et $\|f\|_\infty = \sup |f(t)|$

Proposition :

$\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$, et $\| \cdot \|_\infty$ sont des normes de E .

Preuve :

- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, $f \in E$. $\| \cdot \|_1$ est positive, et $\|\lambda f\|_1 = \int_a^b |\lambda f| = |\lambda| \int_a^b |f| = |\lambda| \|f\|_1 \rightarrow$ Homogénéité.
- Soient f et $g \in E$, $\|f+g\|_1 = \int_a^b |f+g| \leq \int_a^b |f| + |g| = \int_a^b |f| + \int_a^b |g| = \|f\|_1 + \|g\|_1 \rightarrow$ Inégalité triangulaire.
- Soit $f \in E$ tel que $\|f\|_1 = 0$, $|f|$ est continue sur $[a, b]$ et positive, donc $\int_a^b |f| = 0$, par théorème, $|f|$ est nulle et donc f est nulle $\rightarrow$ axiome de séparation.

Ainsi, $\| \cdot \|_1$ est une norme sur E .

Pour montrer que $\| \cdot \|_2$ est une norme euclidienne sur E , on introduit ce qui doit être le produit scalaire associé.

Si f et $g \in E$, $\langle f|g \rangle = \int_a^b f g$, est linéaire à droite par linéarité de l'intégrale, symétrique, positive par positivité de l'intégrale. Soit $f \in E$ telle que $\langle f|f \rangle = 0$, $\int_a^b f^2 = 0$, f^2 est continue et positive sur $[a, b]$, donc par théorème $f^2 = 0$, et donc $f = 0$. Ainsi $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un produit scalaire, donc $\| \cdot \|_2$ est une norme euclidienne.

Le cas de $\| \cdot \|_\infty$ sera étudié plus généralement dans le paragraphe suivant.

1.2.4. Norme de la convergence uniforme sur A

Définition :

Soit $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. On note $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ l'ensemble des applications de A dans $\mathbb{K}$ qui sont bornées sur A .

Propriété :

$\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(A, \mathbb{K})$.

Définition :

$\forall f \in \mathcal{B}(A, \mathbb{K})$, on pose $\|f\|_{\infty, A} = \sum_{t \in A} |f(t)|$.

Théorème :

$\| \cdot \|_{\infty, A}$ est une norme sur $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ appelée norme de convergence uniforme sur A , ou norme infinie sur A .

Preuve :

Soit $f \in \mathcal{B}(A, \mathbb{K})$. $\forall t \in A$, $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$. Soit $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall t \in A$, $|f(t)| \leq M$. Alors $\|f\|_\infty \leq M$.

En effet $\|f\|_\infty$ est le plus petit des majorants. On dit qu'on « passe au sup à gauche ».

- Soit $f \in E$, et $t \in A$. $\|f\|_\infty \geq |f(t)| \geq 0 \Rightarrow$ Positivité.
- Soient $f \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit $t \in A$, $|\lambda f(t)| = |\lambda| |f(t)| \leq |\lambda| \|f\|_\infty$. Par passage au sup à gauche, $\|\lambda f\|_\infty \leq |\lambda| \|f\|_\infty$.
 $\|0\|_\infty = 0$, donc si $\lambda = 0$, $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty$, et si $\lambda \neq 0$, on pose $\lambda f = g \in E \Leftrightarrow f = \frac{1}{\lambda} g$.

On a alors $\left\| \frac{1}{\lambda} g \right\|_\infty \leq \left| \frac{1}{\lambda} \right| \|g\|_\infty \Leftrightarrow \|f\|_\infty \leq \left| \frac{1}{\lambda} \right| \|\lambda f\|_\infty \Leftrightarrow |\lambda| \|f\|_\infty \leq \|\lambda f\|_\infty$, donc $|\lambda| \|f\|_\infty = \|\lambda f\|_\infty \Rightarrow$ Homogénéité.

- Soient f et $g \in E$. Soit $t \in A$, $|(f+g)(t)| = |f(t)+g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Par passage au sup à gauche, $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \Rightarrow$ Inégalité triangulaire.

- Soit $f \in E$ tel que $\|f\|_\infty = 0$. $\forall t \in A$, $0 \leq |f(t)| \leq \|f\|_\infty = 0$, donc $|f(t)| = 0$, donc $f(t) = 0 \Rightarrow$ Séparation.

1.2.5. Normes de la convergence en moyenne et de la convergence en moyenne quadratique

Définition :

Soit I un intervalle non réduit à un point de $\mathbb{R}$.
 On note $L_1(I) = \{f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}) \text{ tel que } f \text{ est intégrable sur } I\}$.
 On note $L_2(I) = \{f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}) \text{ tel que } |f|^2 \text{ est intégrable sur } I\}$.

Définition :

Si $f \in L_1(I)$, on note $\|f\|_1 = \int_I |f|$.
 Si $f \in L_2(I)$, on note $\|f\|_2 = \sqrt{\int_I |f|^2}$.

Lemme :

$L_2(I)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$.

Preuve :

$-\vec{0}_E \in L_2(I)$

$-\text{Si } f \in L_2(I) \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}, \lambda f \in L_2(I)$

$-\text{Soit } (f, g) \in L_2(I)^2. |f+g|^2 = |f|^2 + |g|^2 + 2\Re(\bar{f}g) \leq |f|^2 + |g|^2 + 2|\bar{f}g|$

De plus $(2|f|^2 + 2|g|^2) - (|f|^2 + |g|^2 - 2|f||g|) = |f|^2 + |g|^2 - 2|f||g| = (|f| - |g|)^2 \geq 0$

Donc $|f|^2 + |g|^2 + 2|f||g| \leq 2|f|^2 + 2|g|^2$, ainsi $|f+g|^2$ est intégrable sur I par théorème de domination.

Théorème :

$\| \cdot \|_1$ est une norme sur $L_1(I)$ appelée norme de la convergence en moyenne sur I .

$\| \cdot \|_2$ est une norme euclidienne sur $L_2(I)$ appelée norme de la convergence en moyenne quadratique sur I .

1.3. Boules et sphères

Définition :

Soient $(E, \| \cdot \|)$ un espace vectoriel normé, $a \in E, r \in \mathbb{R}_+$.

1. On appelle boule ouverte de centre a et de rayon $r > 0$ l'ensemble $\mathcal{B}(a, r) = \{x \in E \text{ tel que } \|x - a\| < r\}$.

2. On appelle boule fermée de centre a et de rayon $r \geq 0$ l'ensemble $\overline{\mathcal{B}}(a, r) = \{x \in E \text{ tel que } \|x - a\| \leq r\}$.

3. On appelle sphère de centre a et de rayon $r \geq 0$ l'ensemble $\mathcal{S}(a, r) = \{x \in E \text{ tel que } \|x - a\| = r\}$.

Si $a = \vec{0}_E$ et $r = 1$, on parle de boule (ouverte ou fermée) unité et de sphère unité.

Définition :

Soit $A \subset E$ tel que $A \neq \emptyset$. On dit que A est une partie bornée de E pour la norme $\| \cdot \|$ si $\exists r \geq 0$ tel que $A \subset \overline{\mathcal{B}}(\vec{0}_E, r)$, c'est-à-dire si $\exists r \geq 0$ tel que $\forall x \in A, \|x\| \leq r$.

Exemple :

Sphères unités pour les normes $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$, et $\| \cdot \|_\infty$ dans $\mathbb{R}^2$:

1.4. Normes équivalentes

Définition :

Soient N et $\| \cdot \|$ deux normes sur E .

On dit que N est équivalente à $\| \cdot \|$ si $\exists \alpha, \beta > 0$ tels que $\forall x \in E, \alpha \|x\| \leq N(x) \leq \beta \|x\|$.

On a aussi $\forall x \in E, \frac{1}{\beta} N(x) \leq \|x\| \leq \frac{1}{\alpha} N(x)$, donc $\| \cdot \|$ est équivalentement à N .

Proposition :

Soit $x \in E$, on a $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty$. Ainsi, les normes usuelles de $\mathbb{K}^n$ sont équivalentes.

Preuve :

Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$

$$\text{Ainsi } \|x\|_\infty = |x_{i_0}| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n 1 |x_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{n} \|x\|_2$$

$$\text{Or } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |x_i|^2 \leq \|x\|_\infty^2 \Rightarrow \|x\|_2 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2} = \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

On a ainsi $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty$, ce qui prouve que $\| \cdot \|_\infty$ et $\| \cdot \|_1$ sont équivalentes.

$$\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \text{ et } \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty \leq \sqrt{n} \|x\|_1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \Rightarrow \| \cdot \|_2 \text{ et } \| \cdot \|_1 \text{ sont équivalentes.}$$

Théorème (admis) :

Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.
En dimension infinie, ce résultat est faux.

Exemple :

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On veut montrer que $\| \cdot \|_\infty$ et $\| \cdot \|_1$ ne sont pas équivalentes sur E . On utilise des suites

d'éléments de E . Soit $f_n(x) = \begin{cases} 1-nx, & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0, & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$, $\|f_n\|_\infty = 1$, et $\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n| = \int_0^1 f_n = \frac{1}{2n}$

On raisonne par l'absurde : on suppose que les deux normes sont équivalentes :

$\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\forall f \in E$, $\alpha \|f\|_1 \leq \|f\|_\infty \leq \beta \|f\|_1$, et en particulier pour f_n : $\frac{\alpha}{2n} \leq 1 \leq \frac{1}{2\beta}$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $1 \leq 0$, ce qui n'est pas. Ainsi $\| \cdot \|_1$ et $\| \cdot \|_\infty$ ne sont pas équivalentes dans E .

Dans le cas de $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, on peut utiliser $x \mapsto x^n$, les fonctions « à pics » comme celle utilisée, ou encore les fonctions trigonométriques $x \mapsto \sin(n\pi x)$.

2. Suites vectorielles

Dans cette partie, $(E, \| \cdot \|)$ désigne un espace vectoriel normé, et $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$.

2.1. Suite convergente

Définition :

Soit $l \in E$. On dit que la suite (x_n) converge vers l au sens de $\| \cdot \|$ si $(\|x_n - l\|)$ converge vers 0.
On dit alors que l est limite de la suite (x_n) pour la norme $\| \cdot \|$. On note $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Remarque :

La notion de convergence d'une suite dépend de la norme considérée.

Proposition :

Si (x_n) converge dans $(E, \| \cdot \|)$, sa limite est unique.

Preuve :

Supposons que (x_n) converge vers l et l' , où l et l' sont deux éléments distincts de E .

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow \|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \|x_n - l\| < \varepsilon$
 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, x_n \in \mathcal{B}(l, \varepsilon)$.

De même, $x_n \in \mathcal{B}(l', \varepsilon)$. Or $l \neq l'$ donc $\|l - l'\| > 0$. On choisit $\varepsilon = \frac{\|l - l'\|}{2} > 0$.

$\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \|x_n - l\| < \varepsilon$ et $\exists N' \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N', \|x_n - l'\| < \varepsilon$.

Soit $n \geq \max(N, N')$. $\|l - l'\| = \|(l - x_n) + (x_n - l')\| < 2\varepsilon = \|l - l'\|$.

On obtient $0 < \|l - l'\| < \|l - l'\|$ Impossible, donc $l = l'$.

2.2. Propriétés algébriques

Proposition :

Si (x_n) converge vers l pour la norme $\| \cdot \|$, alors $(\|x_n\|)$ converge vers $\|l\|$.

Preuve :

$\| \|x_n\| - \|l\| \| \leq \|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc par encadrement $(\|x_n\| - \|l\|)$ converge vers 0.

Proposition :

Si (x_n) converge dans $(E, \|\cdot\|)$, elle est bornée. La réciproque est fausse.

Proposition :

Soient des suites (x_n) et $(y_n) \in E^{\mathbb{N}}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Si (x_n) converge vers l dans $(E, \|\cdot\|)$ et (y_n) converge vers L dans $(E, \|\cdot\|)$, alors $(\lambda x_n + \mu y_n)$ converge vers $\lambda l + \mu L$ dans $(E, \|\cdot\|)$.

Proposition :

Soient $(\lambda_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ convergente vers $\lambda \in \mathbb{K}$, et $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergente vers l dans $(E, \|\cdot\|)$. Alors $(\lambda_n x_n)$ converge vers λl dans $(E, \|\cdot\|)$.

Preuve :

$$\|\lambda_n x_n - \lambda l\| = \|\lambda_n x_n - \lambda_n l + \lambda_n l - \lambda l\| \leq \|\lambda_n x_n - \lambda_n l\| + \|\lambda_n l - \lambda l\| = |\lambda_n| \|x_n - l\| + |\lambda_n - \lambda| \|l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Par domination $\|\lambda_n x_n - \lambda l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

2.3. Suites extraites

Définition :

Une suite $(y_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est dite extraite de (x_n) si $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = x_{\varphi(n)}$.

Proposition :

Si (x_n) converge vers l pour $\|\cdot\|$, toute suite extraite de cette suite converge aussi vers l pour $\|\cdot\|$.

Proposition :

Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\exists l \in E$ tel que $x_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ et $x_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$. Alors $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$.

2.4. Suites de Cauchy

Définition :

On dit que la suite (x_n) est de Cauchy pour $\|\cdot\|$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \forall m \geq N, \|x_m - x_n\| < \varepsilon$.

Propriété :

(x_n) est de Cauchy $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \|x_{n+p} - x_n\| < \varepsilon$.

Proposition :

Si (x_n) converge dans $(E, \|\cdot\|)$ vers $l \in E$, alors (x_n) est de Cauchy.

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \|x_n - l\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m \geq N$ et $n \geq N$.

$$\|x_m - x_n\| = \|(x_m - l) + (l - x_n)\| \leq \underbrace{\|x_m - l\|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\|l - x_n\|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon.$$

Définition :

Un espace vectoriel normé est dit complet pour $\|\cdot\|$ si toute suite de Cauchy pour $\|\cdot\|$ est convergente pour $\|\cdot\|$.

Remarque :

Tout espace vectoriel normé n'est pas complet.

Théorème (admis) :

Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

Définition :

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ vérifie le critère de Cauchy pour les séries si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \forall p \geq 1, \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon$.

Propriété :

La série $\sum u_n$ vérifie le critère de Cauchy $\Leftrightarrow (S_n)$ est de Cauchy.

Proposition :

Toute série numérique vérifiant le critère de Cauchy converge.

Proposition :

On retrouve le théorème : Si $\sum u_n$ converge absolument, alors $\sum u_n$ converge, où $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k|$. Par hypothèse, $\sum u_n$ converge, elle vérifie donc le critère de Cauchy. $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon$. Ainsi $\forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}^*, \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon$, donc $\sum u_n$ vérifie le critère de Cauchy, donc converge.

Proposition :

Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On suppose qu'il existe $(\alpha_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N}^*, \|x_{n+p} - x_n\| \leq \alpha_n$ et $\alpha_n \rightarrow 0$. Alors la suite (x_n) est de Cauchy pour $\| \cdot \|$.

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, 0 \leq \alpha_n \leq \varepsilon$. Soit $N' = \max(N, n_0)$. $\forall n \geq N', \forall p \in \mathbb{N}, \|x_{n+p} - x_n\| \leq \alpha_n < \varepsilon$, donc (x_n) est de Cauchy pour $\| \cdot \|$.

2.5. Convergence des suites et normes équivalentes

Théorème :

Si N et $\| \cdot \|$ sont deux normes équivalentes de E , (x_n) converge vers $l \in E$ pour $N \Leftrightarrow (x_n)$ converge vers l pour $\| \cdot \|$.

Preuve :

$\exists \alpha, \beta > 0$ tels que $\forall x \in E, \alpha N(x) \leq \|x\| \leq \beta N(x)$
 $\Rightarrow$: Par hypothèse, (x_n) converge vers l pour $\| \cdot \|$, c'est-à-dire $\|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
 Or $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq N(x_n - l) \leq \frac{1}{\alpha} \|x_n - l\|$, et $\frac{1}{\alpha} \|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $N(x_n - l) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ par théorème d'encadrement.
 $\Leftarrow$: Par hypothèse, (x_n) converge vers l pour N , c'est-à-dire $N(x_n - l) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
 Or $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \|x_n - l\| \leq \beta N(x_n - l)$, et $\beta N(x_n - l) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $\|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ par théorème d'encadrement.

Proposition :

Soient $\| \cdot \|$ et N deux normes de E , on suppose que $\exists \alpha > 0$ tel que $\forall x \in E, \|x\| \leq \alpha N(x)$.
 Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$, et $l \in E$. Si (x_n) converge vers l pour N , alors (x_n) converge vers l pour $\| \cdot \|$.

Proposition :

Soit $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$. $\forall f \in E$, $\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_2 \leq (b-a) \|f\|_\infty$.

Preuve :

- Soit $f \in E$, $\|f\|_1 = \int_a^b |f| \leq \sqrt{\int_a^b 1^2} \sqrt{\int_a^b |f|^2} = \sqrt{b-a} \|f\|_2$.

- $\forall t \in [a, b]$, $|f(t)| \leq \|f\|_\infty \Rightarrow |f(t)|^2 \leq \|f\|_\infty^2 \Rightarrow \int_a^b |f|^2 \leq \int_a^b \|f\|_\infty^2 = (b-a) \|f\|_\infty^2$
 $\Rightarrow \|f\|_2 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_\infty$

Corollaire :

Soit $(f_n) \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$.

- Si (f_n) converge vers f pour $\| \cdot \|_\infty$, alors (f_n) converge vers f pour $\| \cdot \|_2$.

- Si (f_n) converge vers f pour $\| \cdot \|_2$, alors (f_n) converge vers f pour $\| \cdot \|_1$.

2.6. Suites composantes

Définition :

Soit E un espace vectoriel normé de dimension $p \geq 1$. Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ une base de E .

Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On appelle suites composantes de la suite (x_n) dans la base $\mathcal{B}$ les suites $(x_{n,i})$ où $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = \sum_{i=1}^p x_{n,i} \vec{e}_i$.

Théorème :

Soient E un espace vectoriel normé de dimension p finie, $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ une base de E .

Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$, on note $(x_{n,i})$ les suites composantes de (x_n) dans la base $\mathcal{B}$ ($i \in \llbracket 1, p \rrbracket$)

Soit $l \in E$ tel que $l = \sum_{i=1}^p l_i \vec{e}_i$, alors (x_n) converge vers l dans $E \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $(x_{n,i})$ converge vers l_i dans $\mathbb{K}$.

Preuve :

On munit E de la norme 1 associée à la base $\mathcal{B}$: si $x = \sum_{i=1}^p x_i \vec{e}_i$, alors $\|x\| = \sum_{i=1}^p |x_i|$

On sait que (x_n) converge vers l dans $E \Leftrightarrow (x_n)$ converge vers l pour $\| \cdot \|$.

$\Rightarrow$: Par hypothèse, $\|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, c'est-à-dire $\sum_{i=1}^p |x_{n,i} - l_i| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$ on a

$0 \leq |x_{n,i} - l_i| \leq \|x_n - l\|$, or $\|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, et par théorème d'encadrement $|x_{n,i} - l_i| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow (x_{n,i})$ converge vers l_i

$\Leftarrow$: Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, par hypothèse $x_{n,i} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l_i$, donc $x_{n,i} \vec{e}_i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l_i \vec{e}_i$ ($\|x_{n,i} \vec{e}_i - l_i \vec{e}_i\| = |x_{n,i} - l_i| \underbrace{\|\vec{e}_i\|}_{\in \mathbb{R}}$, $|x_{n,i} - l_i| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$).

Par combinaison linéaire de suites convergentes, $\left(\sum_{i=1}^p x_{n,i} \vec{e}_i \right)$ converge vers $\sum_{i=1}^p l_i \vec{e}_i$, donc (x_n) converge vers l .

* * * * *